

# 登園できない病気の一覧表 職員用

(2023年 改訂版)

病気	主な症状	潜伏期間	感染力が強い期間	登園許可書	その他	登園の目安	欠席の表記
インフルエンザ	熱	1～2日	有熱期	医師の判断により (保護者が記入)	感染力大、予防注射あり	診断日を1日目とし、5日間経過、かつ解熱後3日を経過していること	出停
麻疹(はしか)	熱、発疹	10～12日	発疹の出る前後数日	医師の許可書が必要	感染力大、予防注射あり	解熱後3日を経過してから	出停
風疹	熱、発疹	2～3週間	有熱期	医師の許可書が必要	3日はしかとも言う 予防注射あり	発疹消失(発疹出現後約3～4日)	出停
水痘(みずぼうそう)	熱、発疹	1～3週間	有熱期	医師の許可書が必要	感染力大	全ての発疹がかさぶたになるまで	出停
咽頭結膜熱(プール熱)	熱、結膜炎、咽頭炎	2～14日	有熱期	医師の判断により (保護者が記入) 様式1-2に記入	アデノウイルスによるもの	症状消失し2日経過してから	出停
流行性耳下腺炎(おたふく)	熱、耳下腺腫脹	2～3週間	有熱期	医師の許可書が必要	感染力大	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が始まった後5日以上経過し、かつ全身状態が良好であること	出停
百日咳	咳発作	7～10日	初期咳出現～2週間	医師の許可書が必要	予防注射あり	特有な咳が消失し、全身状態が良好。または5日間の適正な抗菌薬による治療を終了するまで	出停
伝染性紅斑(りんご病)	頬の紅斑、発疹 風邪症状(感染初期)	1～2週間	発疹出現前	医師の判断により (保護者が記入)	欠席の必要はないが 妊婦に感染すると胎児に感染の恐れあり	全身状態が良い(発疹出現時は感染力消失)	病欠
流行性角結膜炎(はやり目)	充血、目やに、流涙	2～14日	症状ある間	医師の判断により (保護者が記入) 様式1-2に記入	アデノウイルスによるもの	症状消失	出停
急性出血性角膜炎(アノ熱)	充血、目やに 目の痛み、まぶたの腫れ	24～36時間		医師の許可書が必要		医師により感染の恐れがないと認められてから	出停
感染性腸炎(ノロ・ロタウイルス等)	熱、嘔吐、下痢	1～4日	症状ある間 (3,4週間ウイルス排出すること)	医師の判断により (保護者が記入)	突然の嘔吐、水様の下痢(白～クリーム色)	嘔吐・下痢が治まり、普通の食事ができる	出停
腸管出血性大腸菌感染症(O-157)	腹痛、水様便、血便	3～8日		医師の許可書が必要	食品の十分な加熱を	症状が治まり、連続2回の検便で陰性を確認してから	出停
溶連菌感染症	発熱、咽頭痛、発疹、いちご様舌	2～5日		医師の判断により (保護者が記入)	処方された抗菌薬は最後まで飲みきる(再発・合併症予防のため)	抗菌薬内服後48H経過(治療継続要)	出停
手足口病	水疱性発疹(口腔粘膜、腕・足、手足の末端、お尻)	3～5日	発症後1週間 (2,4週間はウイルス排出)	医師の判断により (保護者が記入)	感染力大(0,1歳児)数週間～数ヶ月後に、爪が剥がれ落ちることがある	発熱なく(解熱後1日以上経過)普通の食事ができる、発疹が多い場合はかさぶたになるまで	出停
ヘルパンギーナ	高熱、咽頭痛、口蓋垂付近に水疱・潰瘍	2～5日		医師の判断により (保護者が記入)	脱水症状に注意 熱性けいれんを伴うことも	(同上)	出停
マイコプラズマ肺炎	熱、咳	2～3週間	症状発現時～1週間	医師の判断により (保護者が記入)	気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎などを合併することあり	発熱や激しい咳が治まっている(0,1歳児は重症化する恐れがあるので、登園前に要受診)	出停
とびひ	びらん、かゆみ、水疱	2～10日		医師の判断により (保護者が記入)	病巣に伝染の恐れ(爪切りし掻き壊しによる感染拡大を防ぐ)	(患部が乾燥)受診し抗菌薬服用後24H経過してから	出停
帯状発疹	体の片側に出る帯状の発疹、皮膚の痛み	不定		医師の判断により (保護者が記入)	水痘ワクチン未接種、水痘にかかっていない者がうつると、水痘にかかることも	全ての発疹がかさぶたになるまで	出停
RSウイルス	熱、咳、鼻水	4～6日		医師の判断により (保護者が記入)	乳幼児期は重症化しやすい	呼吸器症状が消失し、全身状態が良好(0,1歳児は重症化する恐れがあるので、登園前に要受診)	出停
突発性発疹	高熱、発疹	10日		医師の判断により (保護者が記入)	熱性けいれんを伴うことも	熱が治まり、普通の食事がとれる	病欠
新型コロナウイルス感染症	発熱、空咳、倦怠感、味覚・嗅覚の消失、嘔吐、下痢	1～14日(平均3日)	発症後7～10日	医師の判断により (保護者が記入)	感染力大 重症化すると肺炎を引き起こすことも	発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること ※無症状の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること	出停

※アデノウイルス感染症(プール熱、はやり目)は、様式1-2に保護者サインで記入してください。(保護者記入の登園許可書にはなりますが感染力の強い感染症のため、登園の目安は必ず伝えて下さい。)